## AVERTISSEMENTS AGRICOLES 14-72303062

BULLETIN TECHNIQUE STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Tél. 88-30-34

Poste 571

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS 88-06-15 ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIONE, SARTHE, VENDÉE, MAYEND)

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux - Cité Administratice, rue Du petit-Thouars . AMERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

25 frs

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 139 d'AVRIL 1972 -

TOUS DEPARTEMENTS..... p. 18

## ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les projections d'ascospores sont actuellement très abondantes et des contaminations viennent de se produire. Les poiriers ont atteint un stade très sensible à la maladie. La période la plus dangereuse est commencée.

D'autre part, les récentes pluies ont éliminé la protection conseillée dans la note du 4 Avril dans la plupart des vergers.

Par conséquent, dans les vergers de poiriers de tous les départements, il y a lieu d'effectuer un nouveau traitement dès réception de cette note.

TAVELURE DU POMMIER - Les projections d'ascospores sont également très abondantes. Comme pour la tavelure du poirier et pour les mêmes raisons la période la plus dangereuse est atteinte. Dans les vergers de tous les départements, il y a lieu d'effectuer un nouveau traitement dès réception de cette note.

/IMPORTANT/ - Il est rappelé que tout traitement dirigé contre les tavelures et éliminé par les pluies, doit être immédiatement renouvelé sans attendre un avis de la Station.

OIDIUM DU POMMIER - Cette affection continue d'être ralentie par les conditions climatiques actuelles. Cependant la protection contre l'oïdium doit également être renouvelée à l'occasion du traitement anti-tavelure.

PUCERONS et CHENILLES DEFOLIATRICES - Les conditions climatiques actuelles sont peu favorables à la fois à l'évolution de ces parasites et à une intervention. Les traitements dirigés contre ces insectes peuvent donc être momentanément suspendus.

ARAIGNEE ROUGE - Quelques éclosions d'oeufs d'hiver ont été observées. Il est cependant encore beaucoup trop tôt pour intervenir.

## VIGNE

EXCORIOSE - Il est rappelé que le 2ème traitement en cours de végétation doit être exécuté lorsqu'environ 50% des bourgeons ont atteint le stade D-E (stade E = premières feuilles totalement étalées, sarment herbacé nettement visible).

Les traitements faits postérieurement à ce stade sont insuffisamment efficaces. Se reporter aux notes des 25 Février et du 4 Avril.

ARAIGNEE ROUGE - Il est encore beaucoup trop tôt pour intervenir.

## CULTURES LEGUMIERES

TEIGNE DU POIREAU - Effectuer un traitement dès réception de cette note.

MOUCHE DU CHOU - Le premier vol est commencé et la protection des cultures sensibles à ce parasite doit être entreprise.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Pays de la Loire" J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles: R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 13 AVRIL 1972